

## تحقیق اهداف توسعه پایدار رود-دره‌های شهری بر مبنای ارزیابی اکولوژیکی

(نمونه موردی: رود دره دارآباد تهران)

۵۱

**S**ustainable development of urban river valley based on ecological assessment (Case study: Darabad River Valley ,Tehran)

• محمدعلی عالی‌نسبا ، کیانوش سوزنچی<sup>۲</sup>

### چکیده

پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، بخشی از ساختار شهری می‌باشند که طراحی آن می‌بایست در راستای ضروریات زندگی شهری و پاسخگویی به نیاز شهر وندان قرار گیرد. نیازهای شهر وندان دارای ابعاد گستردگی است که جنبه‌های متعددی از جمله زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی را در بر می‌گیرد. در راستای پاسخ‌گویی پایدار به این نیازها، می‌بایست از تمامی پتانسیل‌های موجود در شهر و طبیعت موجود در آن بپره جست. یکی از مهمترین فضاهای طبیعی که همواره توجه مسئولین و برنامه‌ریزان برای بهموجود آوردن فضاهای سبز شهری را به خود جلب کرده است، رودخانه و رود-دره‌های شهری می‌باشد. ساماندهی و احیای این رودها عمده‌تا با اهداف توسعه فضای تفریح‌گاهی صورت می‌گیرد و شرایط اکولوژیک مناسب و پایداری زیست محیطی آن‌ها از اهمیت برخوردار است. از آنجا که فضاهای سبز و رودخانه‌ها در محیط‌های شهری از جمله عوامل با اهمیت معماری منظر و حیات انسان به شمار می‌رود، لذا بایستی نیاز انسان به این فضاهای را به عنوان یکی از مهمترین عوامل اکوسیستم، در چارچوب توسعه و حفظ و نگهداری آن‌ها در نظر داشت. بدین منظور، تحقیق حاضر به بررسی اصول و معیارها ارزیابی اکولوژیک رود-دره‌های شهری با توجه به ارکان مطرح شده در طراحی پایدار منظر می‌پردازد. در این پژوهش از روش تحقیق نمونه موردی با استفاده از راه‌کارهای ترکیبی استفاده شده است. تالیف حاصل از این تحقیق نشان‌دهنده آن است که، عناصر منظر موجود در رود دره دارآباد را می‌توان به چهار دسته اصلی ۱- سطوح آبی ۲- شکل زمینی ۳- پوشش گیاهی و ۴- عناصر انسان ساز (مصنوع) تقسیم نمود که اولین اولویت در اینی ای امنیت اکولوژیکی پایدار این رود دره به حفظ و احیای رودخانه و پوشش گیاهی موجود در بستر دره و باغهای کناری آن، مربوط می‌شود.

### واژه‌های کلیدی:

توسعه پایدار، رود-دره‌های شهری، محیط‌رسانی، پارک

این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد محمد علی نسب با عنوان "معیارها و ضوابط طراحی پایدار در پارک‌ها با رویکرد زیست محیطی در حاشیه رود-دره‌های شهری (نمونه طراحی پارک منطقه‌ای دارآباد، مجاورت تبه سیمین قلعه تا بزرگراه ارتش)" می‌باشد که در دانشگاه تربیت مدرس تهران در حال انجام است.

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

E-mail:a.alinasab.1389@gmail.com

۲. استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

## ۱. مقدمه

### ۱-۱. اهمیت و ضرورت موضوع

رشد جمعیت در شهرها، منجر به توسعه بی رویه شهرها در درون و برون شده و مناطق با ارزش از نظر محیط‌زیست شهری را دچار تخریب و تحول نموده است که منجر به پیامدهای زیست محیطی متعدد شده است. این امر بهخصوص در کلان شهرها اهمیت وافری می‌باشد.

بطور کلی می‌توان چهار دلیل عمدۀ را که باعث کمبود مناطق با ارزش و قابل ملاحظه از نظر زیست محیطی در شهرهای امروز می‌گردد، عبارتند از:

۱. توسعه بدون برنامه شهرها، که تمیل به احاطه کردن و محدود کردن مناطق طبیعی، دالان‌ها (کریدورها) و تکه‌های طبیعی جدا شده که به صورت لکه‌های دور از هم قرار گرفته‌اند، دارند. این تکه‌های باقی‌مانده اغلب به صورت فضاهای منفی در سطح شهرها به وجود می‌آیند.

۲. اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی موجود در شهرها مانند تالاب‌ها، رودها، مراع طبیعی و ... توسط ساکنان منطقه؛

۳. استفاده بیش از حد از مناطق طبیعی و توسعه امکانات تفریحی در آن‌ها؛

۴. تکه‌های باقی‌مانده و دالان‌های طبیعی که اغلب به صورت پارک‌های فرهنگی یا طبیعی به دلیل این‌که فاقد ویژگی‌های مورد نیاز حمایت از گونه‌های بومی است به حال خود رها شده‌اند (Cook, 1991, 7).

از مهمترین فضاهای طبیعی که همواره در معرض آسیب و خطر می‌باشند؛ رودخانه‌ها و رود-دره‌های شهری است. رودهای شهری به دلیل وجود آب، خاک، صخره‌ها و پوشش گیاهی غنی از جمله اکوسیستم‌های طبیعی پلیدار به شمار آیند که بی‌توجهی و سهل‌انگاری در حفاظت مناسب آن‌ها می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

رودهای شهری (بهخصوص رود-دره‌ها) واجد پتانسیلی دو گانه‌اند از طرفی می‌توانند باعث موفقیت در توسعه‌یک شهر شوند از طرفی نیز در صورت استفاده نامناسب از آن‌ها می‌توانند تبدیل به یک فاجعه زیست‌محیطی غیرقابل جیران گردد. با توجه به این دیدگاه، باز زندگانی رودهای شهری نیاز به ادغام کردن مسائل اکولوژیکی با رویکردهای اجتماعی دارد و راهکارها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که تعادل میان رویکردهای اجتماعی، زیبایی‌شناسنامه، هیدرولوژیکی و اکولوژیکی برقرارشود، هدف از این پژوهش یافتن چگونگی برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت رودهای شهری با توجه به نیازهای زیست محیطی منظر پلیدار می‌باشد که این اهداف بیستی در چارچوب حفاظت و تسهیل فرایندهای اکولوژی طبیعی رودهای شهری باشند.

### ۱-۲. اهداف تحقیق

▪ شناسایی عوامل موثر زیست محیطی مربوط به حفاظت

▪ بهبود و طراحی حاشیه رودهای شهری

▪ استخراج چارچوب زیست محیطی برای برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت رودهای شهری

### ۱-۳. سوالات تحقیق

▪ ارزیابی اکولوژیکی رود-دره‌های شهری چگونه می‌تواند

در تحقق اهداف توسعه پلیدار به کار گرفته شوند؟

▪ تجربه ارزیابی اکولوژیک رود دره دارآباد چه آموزه‌هایی را برای حفظ احیا رود-دره‌های شهری در اختیار قرار می‌دهد؟

## ۱-۴. روش تحقیق

این پژوهش بر پایه روش نمونه موردي با استفاده از راهکارهای ترکیبی استوار است. با توجه به ویژگی خاص بستر این پژوهش، ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی در جهت شناسایی چارچوب موضوع و جایگاه عملکرد اکولوژیکی رود-دره‌ها در توسعه پلیدار بستر طرح انجام می‌گیرد. جهت دستیابی به مبانی نظری تحقیق، نخست تعاریف و مفاهیم پلیداری و منظر پلیدار مورد بررسی قرار گرفته، بعد از دستیابی به مفاهیم پلیداری و رویکردهای نظری، اصول و معیارهای طراحی به منظور توسعه منظر پلیدار استخراج گردیده، و در ادامه به ارزیابی و تحلیل راهکارهای مرمت منظر در جهت احیای اکولوژیک رودخانه دارآباد پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با شناسایی معیارهای ارزیابی اکولوژیک به عنوان یکی از سه اصل منظر پلیدار، گامی موثر در جهت احیا و حفاظت زیست‌محیطی رودخانه‌های شهری بردارد.

## ۲. اهداف توسعه پلیدار

اولین رویکردها به مفهوم پلیداری از طرح‌های جنگل‌داری منشاء گرفته است. جایی که بدین صورت بیان شده است: اطمینان از این‌که توانهای موجود منابع جنگلی حفظ شود، یعنی مقدار درختان قطع شده و صدمات وارد به طبیعت جنگل، به طور متوسط از نزد رشد جنگل تجاوز ننماید. اگر از بازده پلیدار تجاوز شود، در بلند مدت نتیجه‌هاش کاهش بازده‌های متوسط خواهد بود، چون منابع آن قدر در حد افراط مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که تجدیدش را نمی‌توان تضمین کرد (Kohler, 1996, 26). این مفهوم ریشه در یک اصل اکولوژیکی دارد. براساس این اصل اگر در هر محیطی به اندازه توان طبیعی فرآوری محیط‌زیست، بهره‌برداری یا بهره‌وری انجام شود، اصل سرمایه‌ی (منابع اکولوژیک) به طور پلیدار باقی‌ماند و استفاده‌ی ما از محیط به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پلیدار است. غالب محققین بنا بر تعریف گزارش بروتلند (Redclift, 1987, 10-12) که در آن سه لایه توسعه، برابری و مساوات، و حفاظت از محیط‌زیست مشخص شده، توسعه پلیدار را در سه بعد اکولوژیکی یا محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهند.

### ۱-۱. پلیداری اجتماعی

پلیداری اجتماعی را می‌توان این‌گونه بیان نمود؛ تداوم تمدنی که در آن انسان‌ها توزیع عادله‌ای بین اغیانی و فقر را شاهد بوده، بهبود کیفیت زندگی حاصل آن است. کاهش تنفس‌های اجتماعی، شیوه سازماندهی سازگار با شرایط اجتماعی، برای ری برای گروههای نژادی، قومی و مذهبی، حقوق انسانی، آموزش و آگاهی‌های زیست محیطی، ترویج نقش خانواده و اجتماعات، حقوق سیاسی و مشارکت و ترویج ارزش‌های اجتماعی، از محورهای اصلی این بعد از توسعه پلیدار هستند.

### ۱-۲. پلیداری اقتصادی<sup>۲</sup>

پلیداری اقتصادی بر حفظ و ارتقاء شرایط اقتصادی، تاکید دارد که در تمام نظام مورد بررسی، جمع می‌گردد. معیارهای اقتصادی ارتباط ناگسستنی با فرایند شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی دارند. سطوح توزیع برایری و بقا در اقتصاد، پدیده‌ای هم محل و هم جهانی است تخصیص بهتر و مدیریت کارآکر بر منابع و جریان سرمایه‌گذاری‌ها تضمین کننده پلیداری خواهد بود. کاهش مصرف انرژی و بیشترین استفاده از پتانسیل موجود

### ۱-۳-۲. کارکرد گرایانه<sup>۷</sup>

سودمندگرایی و توجه به منافع محیط‌زیست و یا به عبارد دیگر کارکرد گرایی ابعاد گسترده‌ای را در اهداف بیوفیزیکی زیست محیطی، شامل می‌گردد. در واقع هرگونه اقدامی در جهت ارتقای محیط‌زیست یک محل باشد را می‌توان جزء این بخش به حساب آورد. از جمله اقداماتی را که می‌توان بدان اشاره نمود، عبارتند از: عملکرد گیاهان و پوشش گیاهی یک منطقه در کنترل فرسایش، حفاظت از حوزه آبخیزداری، مدیریت مواد زائد، کاهش سرو صدا و آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا و Gordon, 1990 Emery, 1986; Goode, 1986; Council Crombie 1990, Grey, 1989; of Europe, 1987; Gilbert and Denke, 1978

اهداف اجتماعی و اقتصادی را می‌توان به طور کلی به مقوله‌های مانند ارتباط با طبیعت، زیبایی شناسی، منافع مرتبط با سلامت جامعه و غیره تقسیم نمود (Wohlwill, 1983; Shaw, 1985; Kaplan 1988). حفاظت زیست محیطی مناسب از مناطق طبیعی باقی مانده در دل شهرها و یا خارج از آن‌ها، به مردم فرصتی برای برقراری ارتباط با طبیعت فراهم می‌کند تا علاوه بر توسعه منافع زیستمحیطی و ارتقای آن، به برمی‌باری حداکثری محیط‌زیست در جهت اهداف اقتصادی-اجتماعی کمک نماید. به عبارت دیگر زیبایی و غنای محیط اطراف، می‌تواند توسط استفاده و برمی‌باری مناسب اقتصادی اجتماعی مناطق طبیعی در جهت افزایش پایداری زیست محیطی افزایش یابد.

محیط در طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت منظر از مهم‌ترین پارادایم‌های آن در پایداری است.

### ۱-۳-۳. پایداری زیستمحیطی<sup>۸</sup>

پایداری اکولوژیکی به معنی حفظ منابع پایه در سطوحی که اختیارات آینده را سلب نکند، و یا حفظ یا ارتقاء ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم است. این بعد از پایداری یعنی تعادل میان بیهوده‌برداری و ظرفیت باز تولید منابع، با استفاده از راه‌کارهایی چون کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش حجم ضایعات، آلودگی‌ها و بازیافت آن‌ها و یافتن فن آوری‌های مناسب تقویت می‌شود. اهداف زیستمحیطی، رامی‌توان در دو شاخه جداگانه مورد مطالعه قرار داد که به مطور کلی عبارتند از: (الف) اهداف بیوفیزیکی؛ (ب) اهداف اجتماعی-اقتصادی.

### ۱-۳-۴. اهداف بیوفیزیکی<sup>۹</sup>

اهداف بیوفیزیکی چارچوب زیستمحیطی شامل چهار هدف می‌باشد که شامل تنوع زیستی، حفظ فرایندهای هیدرولوژیکی، بیهوده وضعیت آب و هوا و منفعت‌طلبی و سودگرایی در محیط‌زیست می‌شود (Cook, 1991). این چهار رویکرد در اهداف زیستمحیطی سعی بر آن است که با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و حداکثری منابع و پتانسیل‌های موجود در منظر، با صرف کمترین انرژی به استفاده حداکثری در ارتقای کیفیت محیط‌زیست دست یابد.

### ۱-۳-۵. تنوع زیستی<sup>۱۰</sup>


حفظ، تگذاری و توسعه گونه‌ها و جوامع منتوغ گیاهی و جانوری با گونه‌های متنوع ژنتیک موجود در محیط‌زیست یک منطقه را شامل می‌گردد. در این تگرش اولویت با جوامع و گونه‌های در خطر انقرض و کمیاب می‌باشد که با شناسایی و حفاظت مستمر در یک محیط از خطر انقرض آن‌ها جلوگیری می‌شود. این رویکرد بهخصوص در محیط‌های جدا افتاده در مناطق شهری (لکه‌های طبیعی) و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی اهمیت وافری می‌تواند داشته باشد.

### ۱-۳-۶. حفظ فرایندهای هیدرولوژیکی<sup>۱۱</sup>

فرایند هیدرولوژی و مدیریت آبهای حاری، تاثیر عمده‌ای در ساختار منظر یک محل دارد. حفظ آبهای موجود در محیط (سطحی یا زیرزمینی) در برابر آلودگی یکی از وظیفه مهم اهداف زیستمحیطی به شمار می‌آید. همان‌گونه که آبها موجود در یک محیط می‌توانند باعث حیات و پایداری محیط‌زیست شود؛ گاهی عواملی مانند سیلاب‌ها و عدم کنترل آن‌ها علاوه بر مسئله آلودگی می‌توانند تاثیر مخرب و غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد. عدم کنترل صحیح سیلاب‌ها به خصوص در رودهای فصلی یا حتی دائمی می‌تواند اکوسیستم و ساختار بیوفیزیکی یک منطقه را تحت الشاعع قرار دهد.

### ۱-۳-۷. بیهود شرایط اقلیمی<sup>۱۲</sup>

استفاده از پوشش گیاهی مناسب، خود می‌تواند سیم اساسی را در بیهود شرایط اقلیمی لیفاد نماید. گیاهان می‌توانند نقش موثری در تغییر محیط پیرامون و کاهش آلودگی هوا داشته باشند؛ پوشش گیاهی علاوه بر آن می‌تواند از بادهای مزاحم جلوگیری کرده و با ایجاد سلیه و کاهش دما، یک خرد اقلیم را به وجود آورد.



### ۳. رویکردهای مطالعه زیست محیطی منظر در برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت

بطور کلی سه روش سنتی برای مطالعه منظر با در نظر گرفتن رویکرد مناسب زیست محیطی وجود دارد که البته هر یک از آنها با معایب و مزایای همراه هستند (Baschak, 1995, p213).

این سه روش عبارتند از: روش طبیعی، علم اکوسیستم و اکولوژی منظر که در زیر به اختصار به توضیح هر یک از آنها پرداخته شده است.

#### ۱-۳. روش طبیعی<sup>۱</sup> (naturalistic approach)

در این رویکرد سعی بر آن است که با تولید طبیعت با تکرار ساختار و ظاهر کل جوامع پوشش گیاهی و جانوری موجود در یک سلیمان محدود و خاص، آنرا به حالت اولیه طبیعی خود برگرداند. (Gustavsson, 1982; Ruff, 1982; Tragay, 1982; Austin, 1984; Rintoul, 1986; Hough, 1990).

در این روش با کمترین دخل و تصرف در طبیعت همراه است به طور کلی در مقیاس‌های محدود و در بافت‌های شهری به طراحی عناصر طبیعی مانند جنگل‌ها، مراعع، تالابها، رودها و ... می‌پردازد.

**۲-۳. علم اکوسیستم<sup>۹</sup> (Ecosystem science)**  
در برنامه‌ریزی منظر این به معنی در برگیری فرایندهای طبیعی مانند توالی، توسعه منظر و غیره در حین برنامه‌ریزی منظر می‌باشد.

در این رویکرد بیشتر به تجزیه و تحلیل اکوسیستم موجود در یک منطقه (جانداران و غیر جانداران) می‌پردازد و سعی بر آن دارد که با برنامه‌ریزی برای ترمیم ساختار اکوسیستم و تابعه آن توسط اکوسیستم حاکم بر منطقه، منظر را در حالت طبیعی خود تجدید دارد. و یا "کارکردن با طبیعت به جای کارکردن بر علیه آن" (Tragay, 1982, p. 31).

**۳-۳. اکولوژی منظر<sup>۱۰</sup> (Landscape ecology)**  
اکولوژی منظر با مجموعه اکوسیستم‌هایی رخدنه در یک ناحیه که از لحاظ جغرافیایی تعریف شده است تعامل می‌کند. Naveh and Lieberman, 1984 ; Forman and Godron, 1986) در واقع در رویکرد اکولوژی منظر تمام اجزا اعم از سیستم‌های طبیعی (اکوسیستم‌های جانداران و غیر جانداران) و عناصر منظر (چمنزارها، جنگل‌ها، مراعع، تالابها، رودها و ...) را در مقیاسی کلان‌تر شامل می‌شود. موضوع مطالعه منظر با رویکرد منظر، ساختار آن، عملکرد و تغییرات صورت پذیرفته در آن بوده است.

## ۴. ارزیابی اکولوژیکی عناصر منظر

شناسلی و ارزیابی اکولوژیکی یک محیط می‌تواند اولین گام در راستای شناخت میزان عناصر منظر یک محیط و مقدمه‌ای بر چگونگی استفاده از این عناصر در طراحی منطقه بر ستر آن محیط باشد. با توجه به این که منظر طبیعی مورد دخل و تصرف انسان‌ها قرار می‌گیرد، معیار ارزیابی اکولوژیکی منظر یک محیط طبیعی می‌تواند بر اساس میزان مداخله انسان‌ها در آن محیط باشد؛ بنابراین هر یک از عناصر موجود در منظر که با حضور انسان و مداخله وی در آن‌جا مورد آسیب یا تغییر قرار گیرد بایستی در ارزیابی اکولوژیکی آن محل در نظر گرفته شود. بر اساس جمع‌بندی مطالعات انجام شده، عناصر منظر را می‌توان با توجه به ۶ معیار، مورد ارزیابی اکولوژیکی قرار داد: ۱- تنوع گونه‌های گیاهی ۲- درجه طبیعی ۳- گونه‌های نادر ۴- ساختار

در یک شهر، اکولوژی منظر با مدیریت لکه‌ها و دالنهای منفرد و جدا افتاده را در یک مقیاس کلان به عنوان مولفه‌های یک منظر کلی در نظر گرفته و سعی در ایجاد یکپارچگی و همبستگی بین عناصر پراکنده منظر در شهر دارد.

بنابر این وقتی که بقایای فضاهای طبیعی در محدوده بافت شهری در نظر گرفته شوند؛ هر سه رویکرد نقش مهمی را می‌توانند در مقیاس خرد تا کلان در احیای اکولوژیک یک منظر شهری ایفا کنند؛ در واقع روش طبیعی مطالعه منظر یک پایه برای طراحی و رویکرد علم اکوسیستم یک پایه برای برنامه‌ریزی و اکولوژی منظر یک پایه برای مدیریت منظر فراهم کرده است.

از این رو در احیای زیستمحیطی رود-دره دارآباد با هدف توسعه پایدار، از رویکرد مطالعه اکولوژیک منظر که در ادامه این پژوهش بدان پرداخته شده است، بهره گرفته شده است.

جدول ۱. رویکردهای مطالعه زیستمحیطی منظر

رویکردهای مطالعه زیست محیطی منظر	منظر	منظقهای	علم اکوسیستم	محلي	سیاست خاص	روش طبیعی	عنصر منظر (چمنزارها، جنگلهای مراعت، تالابها، رودها و...)	کاربرد
رویکرد								
عکس								
دانلود								

( منبع: تکارندهان بر اساس Baschak. Brown, 1995 )

جدول ۲. معیارهای ارزیابی اکولوژیک منظر

معیارهای ارزیابی	مولفه‌های ارزیابی	اهداف	جزئیات کاربردی	امتیاز
تنوع گونه‌های گیاهی	- تعداد گونه‌هایی حاضر - تنوع گونه‌هایی زیاد - تنوع بر جسته برای نوع ریستکامهای خاص	- شناسلی چوام گیاهی منطقه - شناسلی و حمایت چوام در حال انقراض و نادر - شناسلی و حمایت چوام بر جسته و هاتم	مدیریت منظر برنامه‌ریزی منظر	۳
درجه طبیعی	- مناطق طبیعی که در حال نابودی هستند - برخی از مناطق طبیعی حفاظت شده - مناطق طبیعی بکر منشهود	شناسلی میزان بکر بودن منطقه شناسلی میزان مداخلات انسانی	مدیریت منظر برنامه‌ریزی منظر طراحی	۳
گونه‌های نادر گیاهی و جانوری	- ویژگی‌های گونه‌های منطقه - شناسلی جمیعتهای نادر و خوب محلی و بیا گونه‌های در حال انقراض محلی - شناسلی چوام نادر گیاهی و جانوری	حملیت از جمیعتهای نیاب محلی یا منطقه‌ای	مدیریت منظر برنامه‌ریزی منظر	۳
ساختار جامعه گیاهی	- آشکار نبودن ساختار جامعه گیاهی - طبقه‌بندی مناسب نوع پوشش گیاهی جوامع گیاهی	شناسلی و حمایت از چوام گیاهی بومی از طرق طبقه‌بندی دقیق و مناسب	مدیریت منظر برنامه‌ریزی منظر	۳
طبقه‌بندی منظر	- مناظر مصنوعی یا کشاورزی (مناظری که مورد دخلات مداوم انسان قرار دارد) - نیمه طبیعی منظر با گیاهان و جانوران بومی حاضر، که انسان آن را از حالت اولیه خود بیرون برده است. مناظر طبیعی و بکر حفاظت شده	شناسلی منظر از نظر میزان مداخلات انسانی در منطقه طبقه‌بندی منظر به مناظر مصنوعی، نیمه‌طبیعی و طبیعی	مدیریت منظر برنامه‌ریزی منظر طراحی منظر	۳
حساسیت به اختلاط	- حفاظت از برحی از فعالیت‌های بشری در محیط پیرامون یا هر جا که امکان افزایش فعالیت‌های انسانی داشته باشد. - فعالیت‌های کافی در یک منطقه ایک سایت بزرگ که می‌تواند آن را از برایر فعالیت‌های انسانی مقاومت کند.	به حداقل رسانیدن فعالیت‌های انسانی در مناطق طبیعی و بکر که باعث از بین رفتن آن می‌شود.	برنامه‌ریزی منظر طراحی منظر	۳

( منبع: تکارندهان بر اساس Baschak. Brown, 1995 )

- حدود ۴۵ درصد از باغات منطقه در قاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ نابود شده‌اند و بیشترین تخریب در ناحیه ۲ مشاهده می‌شود و پارک‌های ایجاد شده در لین مدت از لحاظ بازده اکولوژیک قابل مقایسه نیستند.
- وضعیت محیط‌زیست منطقه یک به علت بالادست بودن آن تمامی شهر تهران را تحت تاثیر قرار میدهد.
- استفاده از لین محیط‌زیست بیلاقی توسعه ساکنان شهر باعث شکل‌گیری تاریخی و فرهنگی ویژه شمیران گردیده است.
- دره‌های موجود در منطقه عموماً فاقد حریم بوده و از ویژگی‌های کریدور ارتباطی، بهربرداری نشده است. تغییر شکل یافته‌یا کاملاً تخریب شده هستند.
- مهمترین مسلیل زیست‌محیطی منطقه یک ناشی از فعالیت‌های شهری و نبود نظارت کافی و لازم به آنودگی و تخریب محیط‌زیست پدیدار می‌باشد (پورعفر، و همکاران، ۱۳۸۴).

### ۵-۳. عناصر منظری در محدوده رود-دره درآباد

بر اساس مطالعه میدانی صورت پذیرفته در محدوده مورد مطالعه (رود-دره دارآباد- از تپه سیمین قلعه تا بزرگراه ارش) عناصر منظری متعددی که در پایداری اکولوژیک روددره دارآباد مؤثر بودند، شناسایی شدند. این عناصر را می‌توان در چهار بخش اصلی دسته‌بندی نمود که عبارتند از:

- ۱- شکل زمین (شامل: دامنه فرسایش، تپه، دره، صخره، بریدگی، گودال)، ۲- پوشش گیاهی (شامل: بوته‌زارها و چمن‌زارها، باغات کناری، زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی، فضای سبز عمومی و خصوصی، پوشش گیاهی دامنه‌ای)، ۳- عناصر انسان‌ساز یا مصنوع (شامل: اراضی حمل و نقل، مسیرهای پیاده‌روی، پارک کناری، ساختمان‌ها، گورستان) ۴- سطوح آبی (شامل: رودخانه، روان آب‌ها، نهر و جوی، مسیل).



تصویر ۲. رودخانه دارآباد و پوشش گیاهی اطراف آن


جامعه گیاهی ۵- طبقه‌بندی منظر ۶- حساسیت به اختلاط.

### ۵. رود- دره

دره‌های کوهستانی و کوهپایه‌ای کریدورهای حیاتی آب می‌باشند. دره‌ها به دلیل اقلیم‌های فرعی بسیار مساعدتر از پیرامون خود، از دیرباز مکان‌های مناسب برای اسکان و بهره برداری بشر بوده‌اند. پوشش گیاهی خاص دره‌ها، زیستگاه حیات وحش، منابع آب و خاک، همراه با امنیت نسبی، دره‌ها را مکانی مناسب برای محل شکل‌گیری، محل مراکز استقرار و توسعه جوامع در کوهستان‌های فلات ایران کرده است. دره‌ها علاوه بر مبادی جریان آب، کریدورهای جریان هوا نیز می‌باشند این کریدورها شریان‌های حیاتی برای تأمین منابع و همچنین کریدور ارتباط و جریان مواد، انرژی، دسترسی، سرمایه و کاربری از بالادست به پایین دست و بالعکس می‌باشند عوامل طبیعی، ارتفاع و شب و چیز به دلیل شکل خاص و مورفولوژی کوهستان باعث وجود دما، رطوبت، باد و بارندگی متفاوت در ارتفاع می‌گردد که همین مسئله خصوصیات اکولوژیک و پوشش گیاهی متفاوت را موجب شده و باعث ایجاد اقلیم فرعی در ارتفاعات می‌گردد.

### ۱-۵. رود- دره دارآباد

رود- دره دارآباد، یکی از ۹ رود-دره کوهستان‌های شمال تهران می‌باشد. این رود-دره‌ها از شرق به غرب عبارتند از: لارک، دارآباد، جمشیدیه، گلبداره، دربند، ولنجک، درکه، فرخزاد و کن. شش روددره از روددره‌های نام برده شده در منطقه یک شهر تهران واقع است که در شکل زیر نشان داده شده است. آب این رود-دره‌ها از کوه‌های لواسانات و شمیرانات تأمین می‌شوند، و سپس به مسیل‌های داخل شهر هدایت شده و همراه با فاضلاب‌های شهری وارد شده به آن، در نهایت به دشت کویر و دریاچه حوض سلطاندر حنوب تهران وارد می‌شوند. رودهای تهران فصلی بوده و رژیم آبی آن‌ها، رژیم سیلابی می‌باشد، به نحوی که در فصول پاییز و زمستان انباشت برف را دارایم و در فصول بهار هم‌زمان با گرم شدن هوا، ذوب بر فراها آغاز می‌شود. هم‌زمانی ذوب بر فهای بارش فصلی باران باعث بروز طغیان در رودخانه‌ها و ایجاد سیل می‌گردد.




تصویر ۱. رود-دره‌های موجود در منطقه شهر تهران

(منبع: مهندسین مشاور بافت شهر ۱۳۷۵)

### ۵-۶. ویژگی‌های محیط‌زیست منطقه یک تهران

باتوجه به لینکه اکثر روددره‌های شهر تهران در منطقه یک واقع است و همچنین روددره مورد مطالعه (روددره دارآباد) نیز در این منطقه قرار دارد، ابتدا مسائل مهم اکولوژیک و زیست‌محیطی این منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مهم‌ترین این مسائل عبارتند از:

- ۱۲۲ درصد از مساحت کل منطقه یک به عنوان فضای سبز اختصاص دارد که ۳ درصد آن فضای سبز عمومی، ۳ درصد فضای سبز نیمه عمومی و ۱۶ درصد آن فضای سبز خصوصی است.



تصویر ۳. عناصر منظری محدوده مورد مطالعه رود-دره دارآباد (از تپه سیمین قلعه تا بزرگراه ارتش) (منبع: نگارندگان)

جدول ۳. ارزیابی اکولوژیکی عناصر منظر حاشیه رودخانه دارآباد

ردیف	عنصر اصلی منظر	عناصر فرعی منظر	معیارهای درونی اکولوژیکی	معیارهای عملکردی اکولوژیکی
۱	نمای زمین	دامنه فرسایش، پله، دره، صخره، بریدگی، گودال	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷
۲	نمای آبرو	بودجهزارها و چمنزارها، پوشش گیاهی دامنه‌ای، زمین‌های حاصلخیز، کشاورزی، بلاغات کناری، فضای سبز خصوصی، فضای سبز عمومی، درختکاری رهیف	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷	۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷
۳	عنصر انسان ساخت	پارک کنار، مسیرهای پیاده‌روی، اراضی حمل و نقل، ساختمان‌ها، گورستان	۱، ۲، ۳، ۴، ۵	۱، ۲، ۳، ۴، ۵
۴	سطوح آبی	رودخانه، روان‌آب، نهر و جوی، مسیله	۱، ۲، ۳، ۴	۱، ۲، ۳، ۴

(منبع: نگارندگان)

بر دارا بودن تنوع گونه‌های گیاهی و دارا بودن گونه‌های نادر و در حال انقراض، وجود این دو نوع پوشش گیاهی در حفظ خاک، حفظ گونه‌های جانوری و بسیاری از مسائل زیستمحیطی موثر است. دیگر پوشش‌های گیاهی موثر در حفظ منظر پایدار از نظر اکولوژیکی رود دره دارآباد، باغات کناری (با ۱۳ امتیاز) و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی (با ۱۱ امتیاز) است. احیای باغات و زمین‌های کشاورزی در حفظ منظر اکولوژیک رود دره دارآباد، دارای اهمیت بالایی قرار دارد؛ زیرا این باعها در مسائل مهم زیستمحیطی مربوط به رود دره، از جمله احیا و حفظ خرد اقلیم رود دره و همچنین در حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری موت خواهد بود، این باعها و زمین‌های حاصلخیز به دلیل رشد جمعیت و ارزش ملکی پیدا کردن روز به روز از وسعت آنها کاسته می‌شود.

فضای سبز عمومی(شامل پارک حاشیه‌ای و...)، فضای سبز خصوصی(شامل حیاط خانه‌ها و...) و درختان ردیفی حاشیه روودخانه با ۱۰ امتیاز در درجه بعدی سازمان‌دهی و احیا قرار دارد؛ حفظ و سازماندهی پوشش گیاهی فضای سبز عمومی و خصوصی در جهت احیا مسائل زیستمحیطی و خرد اقلیم منظر روید-دره بسیار مهم می‌باشد که باقیستی بدان اهمیت و افرای داده شود.

شکل زمین تاثیر عمده‌ای در نوع و قرارگیری پوشش گیاهی و جانوری در رود-دره‌ها دارد. علاوه بر این تاثیر عمده‌ای در حرکت آبها و سیل‌آبها در رود-دره‌های شهری دارد. شکل زمین را می‌توان تعیین کننده چگونگی حرکت جریان باد و در نسبیت شکل‌گیری خرد اقلیم رود-دره‌ها دانست.

بنابراین شکل زمین را زیست محیطی رود در مسائل مربوط به پلیداری زیست محیطی رود دره ها به شمار آورد که تخریب و از بین رفتن شکل طبیعی آنها بر سلیر مسائل اکولوژیکی تأثیر می گذارد.

در این بخش بر اساس مطالعات میدانی صورت پذیرفته بر روی رود-دره دارآباد، دره اصلی(که رودخانه در آن حربان دارد) و دره‌های فرعی به علت وجود پوشش گیاهی و گونه‌های متنوع جانوری، شماره حیاتی رود-دره دارآباد محاسبه می‌شود و همان‌طور که در جدول شماره ۳ مشخص است با امتیاز ۱۷ بالاترین اولویت را در حفظ و احیای منظر اکولوژیک دارد-درایه خود اختصاص داده است.

از دیگر موارد در این بخش وجود دامنه‌های فرسایش در بستر مسیل‌ها است که به علت انقراض پوشش گیاهی سطحی و عدم سازماندهی و احیا مناسب آن، روز به روز از ارزش اکولوژیک آن کاسته می‌شود. حفظ و احیا پوشش گیاهی و جانوری و همچنین تقویت خاک‌های سطحی آن‌ها می‌تواند در توسعه منظر اکوام ریکاردو-تاتس، افزایش داشته باشد.

تپه (سیمین قلعه) و بردگی به ترتیب با اکتساب امتیازهای ۱۳ و ۱۱، از عوامل موثر در ارزیابی و حفاظت اکولوژیک منظر رود-رده دارآیاد به شمار می‌آید. تپه‌ها همراه با سلیر عناصر شکل زمین تاثیر زیادی در ایجاد خرد اقلیم رود-دره‌های شهری دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نقش آن‌ها در تغییر جهت حرکت بادها، ایجاد سایه در طرفین خود با توجه به حرکت خورشید در تابستان و زمستان، وجود پوشش گیاهی غنی و متنوع و ... اشاره نمود.

که در این سایت به دلیل وجود ساختو سازه‌های انسانی، پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری آن در خط نابودی و انفراط قرار دارد. گودال‌ها و بریدگی‌های نیز از عناصر مهم تاثیرگذار در این سایت و سلیر رود دره‌ها هستند که نقش عمده‌ای را ایمای منظر پایدار اکولوژیکی ایفا می‌کنند. گودال‌ها به دلیل پتانسیل منفی آن یعنی در خطالقعر قرار داشتن و گود بودن

۶- بحث و ارزیابی

از آن‌جا که در محدوده مورد مطالعه عناصر متعددی شناسی شدند و نظر به این که هر یک از معیارها رابطه تنگاتنگی با عنصر اصلی رویداده یعنی رودخانه و سلیر لکه‌های موجود پیرامون آن دارد؛ برای ارزیابی اکولوژیک، عناصر منظری سلیمانی را با دو معیار سنجیده شدند. این دو معیار عبارتند از:

۱- معیارهای اکولوژیک درونی، ۲- معیارهای عملکردی اکولوژیک. معیارهای درونی اکولوژیک شامل ۶ مولقه مطرح در ارزیابی اکولوژیک منظر (تنوع گونه‌های گیاهی، درجه طبیعی، گونه‌های نادر، ساختار جامعه گیاهی، طبقه‌بندی منظر، حساسیت به اختلاط) است که در بخش‌های قبلی به آن پرداخته شد. معیارهای عملکردی نیز شامل میزان ارتباط عناصر منظر با سایر لکه‌های طبیعی و مصنوعی و همچنین دوری و نزدیکی نسبت به رودخانه است. در این ارزیابی برای امتیازدهی، عناصری را که دارای امتیاز ضعیف بودند را با عدد یک (۱)، عناصری که دارای امتیاز متوسط بودند را با عدد دو (۲) و عناصری که دارای ارتباط قوی (خوب) بودند را با عدد سه (۳)، نشان داده شدند.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسانه صورت پذیرفته در محل و نقشه‌های موجود، نتایج زیادی را می‌توان با توجه به جدول بالا و نمودار شماره ۲ استبانت نمود که از جمله مهمترین آن‌ها عبارتند از:

همان‌طور که در جدول بالا و نمودار شماره ۲ مشخص است عناصر منظر حاشیه سطوح آب (کنار روددره دارآباد) از منظر پلداری اکولوژیکی دارای اهمیت بالاتری نسبت به سایر عناصر منظری است. درین عناصر فرعی در این بخش (سطوح آبی)، رودخانه دارآباد (با ۲۳ امتیاز) در بالاترین درجه اهمیت و مسیلهای اطراف رودخانه که دارای پوشش گیاهی متنوع و در معرض نابودی است با ۱۹ امتیاز در اولویت بعدی اهمیت قرار دارد. بنابراین در راستای احیای اکولوژیک منظر روددره دارآباد بایستی به رودخانه که عنصر حیاتی اصلی آن به شماری می‌رود در اولویت حفاظت و احیا قرار گیرد. نهرها و روان‌آبهای نیز با دارا بودن املاک‌های به ترتیب ۱۶ و ۱۴ در اولویت‌های حفظ و احیا قرار دارند.

نهرها تأثیر زیبادی در حیات باغها و مراتع در رود-دره‌های دارد چراکه به واسطه آن‌ها بسیاری از پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری، حیات می‌یابند. بنابرین احیا و حفاظت از آن‌ها می‌تواند تأثیر عمده‌ای در توسعه پایدار اکولوژیکی رود-دره‌های شهری از جمله رود-دره دارآباد داشته باشد.

در این تحلیل پوشش گیاهی موجود در منطقه، به خصوص پوشش گیاهی حاشیه روددره، در اولویت و اهمیت بعدی قرار دارد، این ناحیه دارای پوشش گیاهی متنوعی است؛ اما به دلیل استفاده نامناسب از محیط در معرض نابودی قرار دارد. از خصوصیات منظر رود-دره دارآباد وجود باغهای خصوصی فراوان در اطراف آن است که حیات این باغها به رودخانه وابسته است؛ چراکه آب بسیاری از باغها از طریق مستقیم یا به روش غیر مستقیم (سفرمهای زیرزمینی - چاه) از رودخانه تامین می‌شود که با کانالیزه شدن رودخانه در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است، علوه بر این پوشش گیاهی که به صورتهای جنگلی، بوته‌زارها، پوشش دامنهای وغیره در حاشیه رودخانه قرار دارد به دلیل اجرای کمالان بنی و در نظر نگرفتن مسائل ذیست محیط در بعدض. نابودی، واقع است.

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود در این بخش (پوشش گیاهی)، پوشش گیاهی دامنه های دره (با امتیاز) و بوته ارها و چمن زارهای (با ۱۷ امتیاز) در بالاترین اهمیت مسائل اکولوژیکی قرار دارد؛ زیرا این دو پوشش گیاهی علوه

زیادی را با خود به همراه داشته است؛ زیرا با کانالیزه شدن رودخانه عملاً بسیاری از پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری و اکوسیستم‌هایی که حیات آنها وابسته به رودخانه بود رو به انزوا و نابودی رفتند. وجود بزرگراه‌ها نیز در راستای رود-دره دارآباد باعث شده که بسیاری اکوسیستم‌ها و پوشش‌های گیاهی و همچنین مناظر طبیعی و بکر در اثر آلودگی هوا و سمعی-بصری در معرض نابودی قرار گیرد. از دیگر عوامل موثر که در اثر دخل و تصرف‌های انسانی در محیط رود-دره دارآباد رخ داده است مسیرهای پیاده (با ۱۱ امتیاز)، وجود ساختو سازهای بیش از حد (با ۱۲ امتیاز) و وجود گورستان (با ۱۱ امتیاز) است. ساخت و سازهای بیش از حد در محیط علوه بر ازین بردن مراتع و باغها، باعث آلودگی بصری نیز شده‌اند که منظر رود-دره را مورد آسیب قرار می‌داده‌اند. وجود مسیر پیاده نیز با داشتن خصوصیات مفید باعث مسائل زیستمحیطی زیادی از جمله ازین رفتن جوامع گیاهی و جانوری موجود در محل می‌گردد.


گورستان موجود در جوار رود-دره دارآباد باعث به وجود آوردن لکه سبزی در حاشیه رودخانه گشته که حفظ و احیای پوشش گیاهی موجود در آن می‌تواند بر افزایش توان محیطی و اکولوژیکی منظر رود-دره بیفزاید.

آن معمولاً محل تجمع زباله‌ها و پسماندهای خانگی در فضاهای شهری می‌شود لین در حالی است که این گودال‌ها و بردگی‌ها در رود-دره‌ها معمولاً به صورت آبگیرها و پوشش گیاهی متنوعی است که خود یک اکوسیستم جدا و متفاوت را تشکل می‌شود.

بر اساس مطالعات صورت پذیرفته و تحلیج حاصل از آن، بیشترین تخریب رود-دره‌ها و از جمله رود-دره دارآباد در اثر دخل و تصرف انسان ناگاهانه در محیط صورت می‌پذیرد. همان‌گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود در سلیمان موردنظر علوه بر ساختمناسازی بیش از حد، ایجاد بزرگراه در جوار رودخانه (بزرگراه امام علی(ع) و ارشن) و ساخت پارک محلی در حاشیه رود-دره از مهم‌ترین دخل و تصرف‌های انسانی در این رود-دره ارزیابی شده‌اند. در این بخش بیشترین و مهم‌ترین عنصر که از نظر اکولوژیکی دارای اهمیت قرار دارد پارک کناری (با امتیاز ۱۵) و اراضی حاشیه رودخانه (با امتیاز ۱۳).

پارک کناری که در حاشیه رودخانه و در بستر رود-دره واقع است در جهت رونق بخشیدن به مسائل اجتماعی-اقتصادی و گردشگری احداث گردیده است که با قرارگیری آن در حاشیه رودخانه و کانالیزه شده رودخانه، عوامل زیستمحیطی

نمودار ۲. ارزیابی اکولوژیکی عناصر منظر حاشیه رودخانه دارآباد



## ۷. نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد برای دستیابی به منظر پلیدار با رویکرد اکولوژیک در روددره‌های شهری، بایستی ابتدا ساختار فضایی مطلوب یک شبکه زیست محیطی را در سه مقیاس کلان، میانی و خرد مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد و اولین گام در راه رسیدن به طراحی پلیدار منظر در لین‌گونه سلیمانی شهری (روددره‌های) شناخت عناصر منظری مرتبط با پلیداری اکولوژیک و بخصوص عناصری است که در معرض خطرهای بیشتر زیستمحیطی می‌باشد. با شناسایی این عناصر و سنجیدن آنها با معیارهای اکولوژیک، می‌توان مشخص نمود که کدام از عناصر در اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به سایرین قرار دارد؛ سپس بر اساس نتایج حاصله، در جهت حفظ و احیای منظر راه‌کارهای طراحی داده می‌شود. در سایت موردنظر (روددره دارآباد)، همان‌طور که در قسمت‌های قبل بدان اشاره گردید، ارزیابی اکولوژیک در سه مقیاس کلان، میانی و خرد مورد کنکاش قرار گرفته است. در این تحلیل، رودخانه و احیای پوشش گیاهی روددره در اولین اولویت و درجه اهمیت قرار دارد. در جدول شماره ۴، حوزه‌های عملکردی، اهداف و رویکرد رسیدن به منظر پلیدار اکولوژیک روددره دارآباد در سه مقیاس کلان (منطقه‌ای)، میانی ( محلی ) و خرد ( سایت ) آمده است که بر اساس آن حفظ و احیای اکوسیستمها که حیات آنها وابسته به رودخانه است، به عنوان هدف اصلی مطرح گردیده است.

جدول ۴. حفظ و احیای منظر اکولوژیک پلیدار در روددره دارآباد در سه مقیاس کلان، میانی و خرد

ردیف	مقیاس	حوزه عملکردی	اهداف	روشن
۱	کلان (منطقه‌ای)	روددره دارآباد در مقیاس کلان (ساماندهی طرح‌های بالادست، میانی و پلینی)	- حفظ و احیای تنوع یوشن گیاهی و گونه‌های جانوری در سطح منطقه‌ای - حفظ مناطق بزرگ طبیعی بومی - به هم متصل کردن تکه‌های زیستگاهی	مدیریت منظر
۲	میانی ( محلی )	روددره دارآباد (احیا و حفاظت از طریق متصل کردن لکه‌های طبیعی، پارکها، جوامع گیاهی و جانوری، جوامع انسانی و.....)	- حفظ و احیای زیستگاههای محلی - حفظ و احیای تنوع محلی یوشن گیاهی پراکنده و مختلف	برنامه‌ریزی منظر
۳	خرد ( سایت )	روددره دارآباد در مقیاس خرد (ساماندهی اطراف روددره در محدوده مورد مطالعه)	- حفظ و احیای عناصر منظری از دیدگاه اکولوژیک - حفظ و احیای اکوسیستم‌های داخلی سایت	طراحی منظر

( منبع: نگارندگان )

## پی‌نوشت‌ها

1. Social sustainability
2. Economic sustainability
3. Ecological sustainability
4. biological diversity
5. sustaining hydrologic processes
6. climate improvement
7. utilitarian
8. naturalistic approach
9. Ecosystem science
10. Landscape ecology

## فهرست منابع

- پور جعفر، محمد رضا و همکاران (۱۳۸۴). پروژه طراحی و ساماندهی رود دره دارآباد، معاونت پژوهشی دانشگاه، تربیت مدرس، کارفرما: شهرداری تهران، تهران مهندسین مشاور بافت شهر (۱۳۷۵). مطالعات طرح جامع منطقه یک تهران، تهران: مهندسین مشاور بافت شهر، تهران
- Austin, R. L. , 1984. Designing the Natural Landscape. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Council of Europe, 1987. Development of Flora and Fauna in Urban
- Areas. Nature and Environment Series No. 36. Strasbourg, France
- Baschak Lawrence A. , Robert D. Brown,( 1995 ), An ecological framework for the planning, design and management of urban river greenways . Landscape Research Group of Guelph (LRG2), School of Landscape Architecture. University of Guelph, Guelph, Ont. NIG 2W1, Canada
- Cook, E. A. , 1991. Urban landscape networks: an ecological planning framework. Landscape Res. pp 715-.
- Crombie, D. , 1990. Watershed. Royal Commission on the Future of the Toronto Waterfront. Toronto, Canada:
- Emery, M. , 1986. Promoting Nature in Cities and Towns, A Practical Guide. Ecological Parks Trust, London, UK.
- Gilbert, O. L. , 1989. The Ecology of Urban Habitats. Chapman & Hall, New York
- Grey, G. W. and Deneke, F. J. , 1978. Urban Forestry. John Wiley and Sons, New York.
- Goode, D. A. , 1986. Ecology and nature conservation in London. In: L. W. Adams and D. L. Leedy (Editors), Integrating Man & Nature in the Metropolitan Environment. Proceedings National Symposium on Urban Wildlife. Chevy Chase, MD, 47- November

1986. National Institute for Urban Wildlife, Columbia, MD.
- Gordon, D. (Editor), 1990. *Green Cities, Ecologically Sound Approaches to Urban Space*. Black Rose Books, Montreal.
  - Gustavsson, R. , 1982. Nature on our doorstep: Swedish developments and vegetation structure as a guide in urban landscape design. Land, pp: 2123-.
  - Hough, M. , 1990. *Naturalization/Reforestationof Parks and Spaces*. Final report for the Parks and Recreation Department, City of Kitchener: Hough Stansbury Woodland Limited.
  - Kaplan, R. and Kaplan, S. , 1989. *The Experience of Nature: A Psychological Perspective*. Cambridge University Press, Cambridge.
  - Kohler, Stefan. 1996. The demands and limitations of sustainable water use in Arid region a discussion of sustainable development taking the Wadi Markhah (Republic of Yemen) as an example. *Applied Geography and Development*, Vol. 47:2536-
  - Shaw, W. W. , 1985. Residential enjoyment of wildlife resources by Americans. *Leisure Sci. ,* (7)3: 361375-.
  - Tragay, R. L. , 1982. Ecological approaches: an introduction. *Land. Des. ,* 138: 30.
  - Redclift ,Michael,1987. sustainable development. : exploring the contradiction , Routedge
  - Ruff, A. R. , 1982. *Holland and The Ecological Landscape*. Saskatoon Natural History Society, 1991. *Natural Areas Inventory: Preliminary Report 1991*. Saskatoon Natural History Society, Saskatoon, Saskatchewan.
  - Rintoul, F. , 1986. *A Model for Naturalistic Design Process Based on the ntegration of Aesthetic Theory, Ecological Principles and Design Elements and Principles*. MLA Integrative Project. School of Landscape Architecture, University of Guelph. Unpublished.
  - Naveh, Z. and Lieberman, A. S. , 1984. *Landscape Ecology: Theory and Application*. Student Edition 1990. Springer, New York.
  - Forman, R. T. T. and Godron, M. , 1986. *Landscape Ecology*. John Wiley and Sons, New York.
  - Wohlwill, J. F. , 1983. The concept of nature: a psychologist's view. In: I. Altman and J. F. Wohlwill (Editors), *Behaviour and the Natural Environment*. Plenum Press, New York, pp. 537-.